

PHYLLOMEDUSA ROHDEI (Rohde's Leaf Frog). BRAZIL: BAHIA: Uruçuca (14°35'12" S; 39°17'23"W; ca. 100 m elev). 16 August 2004. O. G. S. Araújo, L. F. Toledo, D. Loebmann, and J. Zina. Verified by C. F. B. Haddad. Coleção de anuros Célio F. B. Haddad, Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, São Paulo, Brazil (CFBH 13189–93). Previously known from the states of Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, Teresópolis and Saquarema Municipalities), São Paulo; Minas Gerais and Espírito Santo, Brazil (Frost 2006. Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 4. <http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.php>; Wogel et al. 2005. J. Nat. Hist. 39:2035-2045; Sazima 1974. J. Herpetol. 8:376-377; Feio et al. 1998. Anfíbios do Parque Estadual do Rio Doce [Minas Gerais]. Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Brasil, 32p.; Vrcibradic et al. 2006. Herpetol. Rev. 37:101). First state record, extends the species distribution ca. 470 km northern from the Municipality of Nova Venécia, state of Espírito Santo (Vrcibradic et al. *op. cit.*) and ca. 780 km northern from the municipality of Viçosa, state of Minas Gerais (Feio et al. *op. cit.*).

Submitted by **OLÍVIA GABRIELA DOS SANTOS ARAÚJO, DANIEL LOEBMANN, JULIANA ZINA,** and **LUÍS FELIPE TOLEDO,** Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista, Caixa Postal 199, CEP 13506-970, Rio Claro, São Paulo, Brasil (e-mail: oliviaraujo@gmail.com).